

أسئلة شائعة عن لقاح الأطفال

BOSTON
PUBLIC
HEALTH
COMMISSION



إرشادات لجنة الصحة العامة لبوسطن

تم التحديث: 2022/04/05

لماذا يجب علي تلقيح طفلي؟

- اللقاح يحميك أنت وطفلك من الإصابة بمرض شديد بكوفيد-19. على الرغم من أن كوفيد-19 عادة ما يكون أخف بكثير في حالة الأطفال، إلا أنه يمكن أن يعاني الأطفال من مرض شديد و مشاكل صحية دائمة نتيجة للمرض (المعروف باسم "كوفيد الطويل").
- يمكن للأطفال نشر الفيروس للآخرين حتى لو لم يشعروا بالمرض، بما في ذلك الأطفال الأصغر من أن يتم تطعيمهم وغيرهم من أفراد العائلة والأصدقاء الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض شديد بفيروس كوفيد-19.
- يمكن أن يساعد تطعيم طفلك على إبقائهم في المدرسة ويجعل استمتاعهم بالأنشطة التي يحبونها أكثر أمانًا!



هل لقاح كوفيد-19 آمن لطفلي؟

- لقاحات كوفيد-19 آمنة وفعالة للبالغين والأطفال. لقد خضعت لأكبر مراقبة للسلامة في تاريخ الولايات المتحدة.
- ملايين الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات فأكثر تلقوا اللقاح بأمان.



ما هو عدد الجرعات التي يحتاجها طفلي حتى يكتمل تطعيمه؟

- يحتاج الأطفال في المرحلة السنوية 5 - 11 سنة الى الحصول على جرعتين من لقاح كوفيد-19 حتى يُنظر إليهم باعتبارهم حصلوا على التطعيم بالكامل. يحتاج طفلك لأكثر من جرعة واحدة لتكون لديه أقصى حماية ولبناء مناعة أكبر.
- يجب أن يتلقى المراهقين في المرحلة السنوية 12 - 17 سنة كوفيد-19 جرعة محفزة بعد خمسة أشهر على الأقل من حصولهم على جرعتهم الثانية من لقاح كوفيد-19.



إذا كان لا يزال لديك أسئلة حول فوائد تطعيم طفلك لقاء المخاطر، فإن **BPHC** تشجعك على مناقشتها مع طبيب الأطفال الخاص بطفلك أو غيره من مقدمي الخدمات الطبية الموثوق بهم.


أسئلة شائعة عن لقاح الأطفال

إرشادات لجنة الصحة العامة لبوسطن



ما هي الأعراض الجانبية للقاح كوفيد-19؟

- الآثار الجانبية الشائعة تشبه تلك الخاصة باللقاحات الأخرى، بما في ذلك الألم أو التورم أو الاحمرار في الذراع حيث تم إعطاء اللقاح أو الشعور بالتعب أو الصداع أو آلام العضلات أو الغثيان أو الحمى أو القشعريرة. هذه الآثار الجانبية هي علامة على أن جهاز المناعة لدى طفلك يقوم ببناء حماية.



- تميل الآثار الجانبية إلى أن تكون خفيفة في الأطفال وعادة ما تستمر أقل من يوم.

- الآثار الجانبية الشديدة نادرة جدا.

- يمكن أن يحدث رد فعل تحسسي شديد (الحساسية المفرطة) بعد أي لقاح ولكنه نادر الحدوث. يخضع الجميع للمراقبة من قبل أخصائي طبي بعد الحصول على لقاح كوفيد-19. إذا حدث رد فعل يتم معالجته على الفور.
- أصيب عدد قليل من المراهقين بالتهاب في القلب (التهاب عضلة القلب أو التهاب غشاء التامور) بعد تلقي اللقاح. معظم الحالات خفيفة وتستجيب بشكل جيد للعلاج والراحة.

- لا يمكن لطفلك أن يصاب بكوفيد-19 من اللقاح.

- ليس هناك دليل على أن لقاحات كوفيد تؤثر على نمو أو على خصوبة الأطفال أو البالغين.

كم يكلف ذلك؟

اللقاح **مجانيًا**، ولن يُطلب منك **أبدًا** إظهار دليل على تمتعك بالتأمين الصحي أو الهوية أو وضع الهجرة بالنسبة لك حتى تتلقى لقاح كوفيد-19 الخاص بك في موقع ترعاه **!BPHC**

تحضير طفلك للقاح كوفيد-19

- قبل تطعيمهم، تحدث مع أطفالك حول الآثار الجانبية المحتملة وما هو متوقع.
- لا ينصح بتناول دواء مسكن للألم قبل التطعيم لمحاولة منع الآثار الجانبية المحتملة.



هل يمكن لطفلي الحصول على اللقاح إذا لم أكن برفقته؟

نعم، لكن هناك حاجة لنماذج الموافقة المُعبئة والمُوقَّعة حتى يجري تلقيح الطفل دون وجود الوالدين. يمكن العثور على نماذج الموافقة

على موقع **Mass.gov**.



المراجع:

Frequently Asked Questions about COVID-19 Vaccination in Children. CDC. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq-children.html>

10 Things to Know About the COVID-19 Vaccine for Children. CDC. <https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/planning/children/10-things-to-know.html>

Hause AM, Baggs J, Marquez P, et al. COVID-19 Vaccine Safety in Children Aged 5-11 Years – United States, November 3-December 19, 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021;70:1755–1760. DOI: <http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm705152a1>

Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee October 26, 2021 Meeting Briefing Document- FDA. <https://www.fda.gov/media/153447/download>

Vaccine Facts for Parents. County of Los Angeles Public Health. http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/vaccine/VaccineFacts_Parents.pdf