

أسئلة شائعة عن لقاح الأطفال

الأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 5 سنوات

إرشادات لجنة الصحة العامة لبوسطن

تم التحديث: 2022/29/06



لماذا يجب علي أن أعطي طفلي اللقاح عندما يكون عمره ستة أشهر أو

- توصي لجنة الصحة العامة ببوسطن BPHC بأن يتم تطعيم كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر فأكثر ضد كوفيد-19. اللقاح يحمي طفلك من الإصابة الشديدة بالمرض نتيجة كوفيد-19.
- يمكن أن يساعد تطعيم الأطفال المؤهلين في وقايتهم حقًا من الإصابة بالمرض حتى لو أصيبوا بالعدوى وكذلك المساعدة في منع المضاعفات الخطيرة قصيرة وطويلة الأجل لكوفيد-19
- يمكن للأطفال نشر الفيروس للآخرين حتى لو لم يشعروا بالمرض، بما في ذلك الأطفال الأصغر من أن يتم تطعيمهم وغيرهم من أفراد العائلة والأصدقاء الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد بفيروس كوفيد-19.
- يمكن أن يساعد تطعيم طفلك على إبقائهم في رعاية الأطفال ويجعل استمتاعهم بالأنشطة التي يحبونها أكثر أمانًا!



هل لقاح كوفيد-19 آمن على طفلي؟



- نعم. إن لقاحات كوفيد-19 آمنة وفعالة للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر فأكثر.
- إن ملايين الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات فأكثر قد تلقوا اللقاح بأمان. تفوق المخاطر والمضاعفات الخطيرة المحتملة لكوفيد-19 تلك المخاطر المحتملة للتفاعلات السلبية النادرة للقاح.

هل يتلقى الأطفال جرعة من لقاح كوفيد-19 أقل من المراهقين والبالغين؟



نعم. تعتمد جرعة لقاح كوفيد-19 على العمر في يوم التطعيم، وليس على حجم الطفل أو وزنه. وينطبق هذا أيضًا على اللقاحات الأخرى الموصى بها بشكل روتيني، مثل لقاحات الإتهاب الكبدي A والإتهاب الكبدي B.

هل يمكن للأطفال تلقي لقاحات أخرى بشكل آمن في نفس يوم تلقيهم لقاح كوفيد-19؟



- نعم. التطعيم الروتيني هي خدمة رعاية وقائية مهمة لا ينبغي تأخيرها.
- إذا تم إعطاء لقاحات متعددة في زيارة واحدة، فسيتم إعطاء كل حقنة في مكان مختلف، بحسب التوصيات وفقاً للعمر.

أسئلة شائعة عن لقاح الأطفال

الأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 5 سنوات

إرشادات لجنة الصحة العامة لبوسطن



هل ما يزال من الواجب حصول طفلي على اللقاح إذا كان قد أصيب فعلاً بفيروس كورونا؟



- نعم. تظهر الأدلة أن الأشخاص يكتسبون مزيد من الحماية من خلال حصولهم على اللقاح بعد إصابتهم بالفيروس المسبب لكوفيد-19. هذه المناعة مهمة للحفاظ على طفلك محميًا في المستقبل من الإصابة بالمرض الشديد نتيجة كوفيد-19.
- بالنسبة للأطفال الذين أصيبوا بفيروس كوفيد-19، فيمكن تأجيل جرعتهم التالية لمدة 3 أشهر من وقت ظهور الأعراض، أو إذا لم تظهر عليهم الأعراض، فبعد 3 أشهر من تلقي نتيجة اختبار إيجابية.

جدول التطعيم

يجب أن يحصل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات على نفس اللقاح لجرعاتهم الثانية (والثالثة) من سلسلتهم الأولية التي تلقوها في جرعتهم الأولى. سيتم اعتبارهم قد حصلوا على اللقاح بالكامل بعد أسبوعين من جرعة فايزر الثالثة أو جرعة مودرنا الثانية.



فايزر

- الأعمار: من 6 أشهر إلى 4 سنوات
- الجرعات: ثلاثة
- الجدول: تؤخذ الجرعة الثانية على الأقل 21 يومًا (3 أسابيع) بعد الجرعة الأولى، وتؤخذ الجرعة الثالثة على الأقل 56 يومًا (8 أسابيع) بعد الجرعة الثانية.



مودرنا

- الأعمار: من 6 أشهر إلى 5 سنوات
- الجرعات: إثنان
- الجدول: يتم إعطاء الجرعة الثانية على الأقل 28 يومًا (4 أسابيع) بعد الجرعة الأولى.

إذا كان لا يزال لديك أسئلة حول فوائد تطعيم طفلك لقاء المخاطر، فإن BPHC تشجعك على مناقشتها مع طبيب الأطفال الخاص بطفلك أو غيره من مقدمي الخدمات الطبية الموثوق بهم.

المراجع:

<https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccin-es.page#chil-d>
<https://www.cd.c.gov/vaccin-es/co-vi-d-19/pl-anning/chil-dren/6-things-to-know.html>